

〔カルブチレート水和剤（フロアブル）〕

バックアップフロアブル

有効成分：カルブチレート…………… 45.0%

性 状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 危 険 物：－
 有効年限：3年
 包 装：1ℓ×15本
 5ℓ×4本

バックアップは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

〔特長〕

- 広い殺草スペクトラムを有し、一年生及び多年生雑草全般を枯らすことができる。
- 残効期間が長く、安定した効力がある。
- フロアブル剤なので薬液調製が容易である。

〔適用雑草と使用方法〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	カルブチレートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、駐車場、運動場、住宅の道路等	一年生雑草	雑草発生前	0.5～1ℓ ／10a	200ℓ ／10a	2回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2回以内
		多年生雑草	雑草生育期	1～2ℓ ／10a			植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布	

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用する。
- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。
- 雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所では、散布をさける。
- 本剤は生育の進んだ雑草には効果が劣ることがあるので、時期を失ないように散布する。一年生及び多年生雑草に使用する場合は、雑草発生前～雑草生育期（草丈30cm以下）が散布適期である。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意する。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所などでは使用しない。また、樹木類等有用植物の根が分布していると思われる所では使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。



●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

●かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。

●公園、堤とう等で使用する場合は、小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払う。また散布後にあっても、少なくともその当日は散布区域に立ち入らないように縄囲いや立札を立てるなど配慮する。

●使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

●水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。

[保管]：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管する。

農薬登録(登録番号)：エス・ディー・エス バイオテック (20063)

販売：丸善薬品産業、出光アグリ